

Näagus broodia õitseb südasuvel

Targu Talita toimetusse he-
listanud lugeja rääkis, et sai
kusagilt broodia sibula ning
proovis seda ajatada, aga
õisi ei tulnud. Nüüd tahab
ta teada, mis lill see üldse
on. Kuna seda vähe tuntud
taime pakub ka OÜ Aiasõber
oma kevadises sibullillede
valikus, palusime firma juhil
Lembit Kaarnal lillekest
lähemalt tutvustada.

Broodia (*Brodia*) on umbes 15 liigiga
sibulmugultaimede perekond laugu-
liste sugukonnas. Nägus broodia (*B.
elegans*) sirgub kuni 30 cm kõrguseks.
Ta on vähenõudlik ja vastupidav, teda
on lihtne kasvatada. Sibulaid pole vaja
talveks üles võtta.

Broodia õitseb juulis-augustis. Si-
nised kuni sinilillad kellukjad õied on
koondunud hõredatesse sarikõisiku-
tesse ja puhkevad pärast jaanipäeva.

Leidke broodiale soe päikesele ava-
tud ning vett hästi läbilaskva pinnase-
ga koht. Vältige paika, kus sügisel ja
talvel on liigniiskust, mugulad võivad
seal hävida. 3–4 aasta tagant võiks mu-
gulapesad pärast õitsemist välja kaeva-
ta, eraldada tütmugulad ning taimed
taas maha istutada. Samas võib mugu-
laid hoida ka ületalve nagu gladioli.

Broodia talub pikemaid kuivape-
riode ja on leplik kerge varju suhtes.
Lumeta talvel vajab kasvukoht kaitset.

Mugulate istutamisel jätkke nende
vahele umbes 10 cm. Sobiv istutussü-
gavus kergemas mullas on 4–5 mugu-
la läbimõõtu. Raskemas mullas ei soo-
vita ma broodiat üldse kasvatada või
siis pange mugul 3–4 kordse läbimõõ-
du sügavusele.

Kuna broodia võib ühel kohal kas-
vada tükk aega järjest, sobib ta hästi
püsikupeenra serva, samuti madalate
pöösaste vahele. Ta on hea kaaslane
pojengidele, kõrrelistele, astilbedele,
madalamakasvulistele sibullilledele.

Kodustes tingimustes broodiat kah-
juks ajatada ei õnnestu. Hollandi lille-
kasvatataitel on tehnoloogia ajatami-
seks olemas.



Nägus broodia.

Broodiat aetakse sageli segi suvitä-
hikuga (*Triteleia*) ning vahel ka sämp-
lillega (*Dichelostemma*). Kõigi kolme
perekonna esindajad kasvavad loo-
duslikult Põhja-Ameerika lääneosas
ning on botaaniliselt üksteisele lähe-
dased.

Hüatsint-suvitähikul (*T. hyacin-
thina*) on valged kuni lavendliroosad
tähtjad õied, mis paiknevad 45–60 cm
kõrgustel vartel kumerates sarikõi-
sikutes. Hõre suvitähik (*T. laxa*) kas-
vab 60–75 cm kõrguseks. Eestisse on
mugulaid toodud peamiselt Hollan-
dist, kus ta on laialt levinud. Tuntuim
sort on lillade õitega 'Koningin Fabio-
la', mis on põhiliigist jõulisema kasvu
ja suurema arvu õisikuvartega. Õitseb
tavaliselt juulis.



Hõre suvitähik, kellega broodiat sage-
li segi aetakse.

REPRO

MARIT KAARNA